

1

問 1

2022 年と 2023 年のアメリカ合衆国における出生 100,000 人あたりの主要な 10 の乳児死亡原因とその割合

問 2

約 20% (111.4 / 560.2 = 19.9%)

問 3

乳児死亡原因は、2022 年、2023 年ともに先天奇形が最も多く、次いで低出生体重が多い。いずれも 2022 年よりも 2023 年の割合が増加し、両者で全体の 3 分の 1 を占めている。上位 5 位までの順位は変化がなく、割合が減少した死亡原因は、乳児突然死症候群、不慮の事故、母体合併症、臍帶・胎盤合併症である。とくに、臍帶・胎盤合併症は 17.7 から 15.8 へと有意に減少し、第 6 位から第 7 位となった。

(193 字)

2

問 1

身体活動とは、骨格筋によって生み出されるエネルギー消費を伴う身体の動きを指し、仕事、家事、交通手段、余暇時間、または運動やスポーツ活動に参加する際など、多様な強度で行われるものである。

問 2

女性が男性よりも活動的でないこと、国や地域内およびその間で生じる身体活動レベルの大きな違い

問 3

技術革新と座ったままの職業や余暇活動への移行、個人の動力付き交通手段の普及が進むこと

3

問 1

The average life expectancy for Japanese women is 87 years old, and their healthy life expectancy is 75 years old.

問 2

Please explain the treatment method and possible side effects of the medication to the patient.

問 3

Sharing information across the team improves patient safety.